

Biomín[®] Specialitete


Prašiči pitanci – pujski – plemenske svinje



Naturally ahead

≡ **Biomín[®]** ≡

Izdelki, namenjeni plemenskim svinjam



Biomin® Jump&Run

Razkrečenje na novo skotenih pujskov lahko v proizvodnji prašičev povzroči bistvene izgube. Razkrečeni pujski se pojavljajo zaradi nepopolno razvitih mišičnih vlaken mišic zadnjih okončin. Vzroka za to sta poleg genetskih vplivov in prezgodnje kotitve tudi pomanjkljiva prehrana in obremenjenost z mikrotoksini v času brejosti. Biomin® Jump & Run zagotavlja oskrbo vzrejnih prašičev z energijo in s tem optimalne pogoje za razvoj pujskov. Dodatno vsebuje Mycofix®.

Odmerjanje: 0,5 % za krmo v času brejosti

Biomin® SauenFit

Dobro pripravljeni na laktacijo!

Biomin® SauenFit vsebuje surove vlaknine Biomin® ADF, ekspanzirane sojine lupine in biovlakna Biomin®. S tem spodbuja delovanje črevesja in izboljšuje konsistenco blata v času tik pred kotitvijo. Dobro prebavljive in okusne sestavine zagotavljajo dobro hranjenje in optimalno oskrbo prašičev z energijo v času kotenja.

Odmerjanje: kot Top Dressing, 300 – 500 g od 112. dne brejosti do prvega dneva po prasnju

brejost


prasitev



Biomin® pH D Top

Za ciljno znižanje pH-vrednosti urina v kritičnih fazah reprodukcijskega cikla (čas okoli kotitve in parjenja). Biomin® pH D Top učinkovito spodbuja znižanje pH-vrednosti v urinu (Müller, 2014) in tako ustvarja neugodne pogoje za bolezenske bakterije.

Odmerjanje: 0,5 % v pripravljene krmi, kritičnih fazah, v času odstavitve/parjenja in kotenja



Biomin® LocoMote

Dva faktorja, ki sta pomembna za trdožive vzrejne prašiče z veliko prirejo, sta stabilna osnova in zdravi parklji. Optimalna osnova usnjice s hranilnimi snovmi spodbuja nastajanje odporne roževine na krempljih. Organsko vezane prvine so na voljo v velikih količinah in izboljšujejo oskrbo roževinastega tkiva.

Odmerjanje: 0,5 % samostojne krme v obdobju najmanj 3 – 4 mesecev



laktacija

odstavitev

cas po
porodu
pripust

Digestarom® P.E.P. green

Za spodbujanje prebave.

Digestarom® P.E.P. je poseben izdelek, sestavljen iz fitobiotikov in sadnih oligosaharidov. Digestarom® P. E. P. green optimizira prebavo vzrejnih prašičev in povečuje hranjenje – dobro delujoča prebava je pomemben ukrep v MMA-preventivi.

Odmerjanje: 0,5 % v krmi za pujske, biološko primeren

Biomin® FertiLac Plus

Za optimalno energijsko in hranilno oskrbo prašičev z visoko prirejo v času laktacije.

Poleti (oz. vse leto pri mladih prašičih in prašičih z visoko prirejo) zadostno hranjenje v času sesanja predstavlja težavo. Z dodatkom velike količine energije in aminokislin ter posebnih dodatkov Biomin® FertiLac Plus lahko izboljšamo hranjenje in preprečimo negativno energijsko bilanco.

Odmerjanje: 2 % v krmi za sesne pujske ali 100–200 g/prašiča/dan v času laktacije

Biomin® MegaFat

Za več maščobe in energije v porciji.

Za veliko plodnost vzrejnih prašičev je potrebna dobra telesna kondicija. Posebej pri porcijah s poudarkom na žitu je vsebnost surovih maščob v krmi pogosto prenizka. Biomin® MegaFat predstavlja vir kakovostnih maščob, ki se uporabljajo za zvišanje vsebnosti surovih maščob in energije v krmi za vzrejne prašiče.

Odmerjanje: 0,5 – 3 % v pripravljene krmi

Biomin® Aminokern

Viri beljakovin najvišje biološke valentnosti, kot je ribja moka, so idealni za oskrbo vzrejnih prašičev s proteini. L-carnitin povečuje učinkovitost energijske presnove prašičev in je še posebej pomemben v zahtevnih fazah prireje.

Odmerjanje: 2 – 2,5 % v pripravljene krmi

Biomin® BelegeTop

S krmljenjem Flushing z Biomin® BelegeTop dodajamo prašičem kakovostno energijo in vitamine. To spodbuja presnovo in hormonsko ravnovesje. Delujoče hormonsko ravnovesje je pogoj za pravočasno, jasno vidno pripravljenost na brejost in visoko ovulacijsko stopnjo. Sredstvo je še posebej primerno za hranjenje po ceveh kot Top Dressing.


Odmerjanje: 500 g na prašiča na dan kot Top Dressing od odstavitve do pripravljenosti na brejost

Biomin® TopRausche

Močna in opazna pripravljenost na brejost je pogoj za uspešno osemenitev. Biomin® TopRausche prinaša vezane prvine, vitamine in fitogene dodatke, spodbuja začetek in dober potek pripravljenosti na brejost.

Odmerjanje: 2 zvrhani merilni žlici (20 g) na prašiča in na dan od odstavitve do parjenja

Izdelki, namenjeni pujskom



Skotitev

Sesni pujski

Ferkel Dry

Ferkel Dry je posipni prah, ki skrbi za to, da se pujski po kotitvi hitro posušijo, ter ustvari suh in čist boks. Pujski se hitro segrejejo, so vitalnejši in začnejo hitreje sesati.

Odmerjanje: 0,5–1 kg na leglo pri kotitvi

Biomin® PigFer

Alternativno injekcijam železa predstavlja PigFer, sredstvo za oralno uživanje železa pri pujskih. S posebnim emulzijskim postopkom se lahko železove spojine absorbirajo neposredno iz črevesja in so tako takoj na voljo.

Odmerjanje: 2 ml na sesnega pujska

Biomin® FerkelTorf

Z vitamini in s prvinami obogatena prst za ritje, ki zadovolji potrebe pujskov po ritju in pomaga ohranjati ravnovesje črevesne flore.

Odmerjanje: 100 – 300 g dnevno na leglo v fazi sesanja

Biomin® BioLac 3e

Kombinacija kakovostnih mlečnih izdelkov ter esencialnih vitaminov in hranilnih snovi predstavlja idealno mlečno napajališče za pujske, ki je primerno kot dodatna krma za prašiče, pri velikih leglih in pomanjkanju mleka pa tudi pri hranjenju z umetnimi krmilniki.

Odmerjanje: 150 g/l vode, zmešati v cca 55 °C topli vodi od 2. dne po kotitvi

Digestarom® P.E.P. liquid

Energija s fitogenimi učinkovinami in z vitaminom E v tekočem stanju za oralne odmerke za sesne pujske. Izgube pujskov zaznavamo predvsem v prvih 3 – 5 dneh. Pujskom s prenizko težo in z oslabljenim pujskom je treba v tem obdobju dodajati energijo in hranilne snovi, da povečamo vitalnost in odpornost.

Odmerjanje: 1 – 2 ml na sesnega pujska zaužiti oralno



Odstavljeni pujski

Biomin® CMX

Ta novost na rastlinski osnovi je namenjena spodbujanju delovanja želodca in črevesja v času po odstavitvi in s tem povezano menjavo krme. V različnih poskusnih vrstah smo testirali učinek pri odstavljenih pujskih z drisko.

Odmerjanje: 1 % v krmi za odstavljene pujske

Biomin® Weanolyte

Nadomestna dietna krma za pujske za stabilizacijo ravnovesja med vodo in elektroliti. Veliko energijskih virov dobavlja lahko prebavljivo energijo, življenjsko pomembni elektroliti pa pomagajo pujskom hitro ponovno vzpostaviti moteno tekočinsko ravnovesje. Izdelek se hitro topi v vodi, je dobrega okusa in pokaže svoj dietetični učinek hitro po zaužitju.

Doziranje: 50 g/l vode, največ 0,5 l na pujska in na dan za največ 3 dni

Vzrejni pujski

Biomin® SCC

Infekcije s streptokoki so najpogostejše obolenje pri odstavljenih in vzrejni pujskih. Zlasti karbonske kisline in fitogeni dodatki spodbujajo hranjenje ter prebavne procese. To pa pozitivno vpliva na vitalnost pujskov.

Odmerjanje: 1 % v krmi v času odstavitve, 0,5 % v krmi v času vzreje

Biomin® ONK

Pri vnetju ušes se potrebe po proteinih pri pujskih povečajo. Za pujske z vnetjem ušesa je značilna visoka potreba po proteinih. Dragocene sestavine krvi vplivajo hkrati pozitivno tudi na krvno sliko in strjevanje krvi (beljakovine) ter pomagajo uravnati sistem strjevanja krvi.


Odmerjanje: 0,5 % v krmi v času odstavitve in vzreje

Biomin® FerkelFaser

Za večjo stabilnost pri odstavitvi in vzreji kakovostne surove vlaknine spodbujajo črevesno peristaltiko in prebavo hranilnih snovi. Pri tem imajo patogene bakterije na voljo manj hranilnih snovi. Zaradi visoke 44-odstotne vsebnosti surovih vlaken zadošča za zadostno oskrbo pujskov z vlakninami že majhna količina.

Odmerjanje: 1 – 3 % v krmi za pitane pujske

Izdelki, namenjeni prašičem pitaščem



prašiči pitašči

Biomin® DuoPlex DS Plus

Visoka vsebnost substanc z bakterijsko fermentacijo v debelem črevesju in primeri neprebavljenih sestavin krme lahko spodbudijo pojav težav z grižo. Biomin® DuoPlex DS je bil razvit posebej za izboljšanje prebavljivosti porcij in skrbi za to, da so patogenim bakterijam na voljo neprebavljene hranilne snovi.

Odmerjanje: 0,5 % v pripravljeni krmi za pujske in pitane prašiče

Biomin® PropioBac

Higienske zahteve so pri sistemih s tekočo krmo višje. Uporaba bakterij mlečne kisline pozitivno vpliva na sestavo flore klic. Biomin® Propio Bac prispeva k zmanjšanju neželenih klic v napravah za dovajanje tekoče krme in črevesju pitanih prašičev.

Doziranje: 100 g/1000 l krmne juhe

Biomin® Relax KS

Biomin® Relax KS vsebuje posebej izbrana eterična olja in aromatske snovi. Gre za snovi čistega rastlinskega izvora, ki s svojim pozitivnim učinkom spodbujajo mirnost in prebavo. Ciljna uporaba pri nemiru, kanibalizmu in pri premestitvi v drugo skupino.

Odmerjanje: 0,2 – 0,25 % v krmi za pitance



Druge specialitete Biomin®

Mycofix® in Mycofix® 5.E

Mikotoksini poslabšajo zdravje in prirejo živali. Mycofix® je rešitev za uspešno upravljanje tveganj zaradi mikotoksinov in odločilno prispeva k spodbujanju prireje živali pri mikotoksinih, ki jih vsebuje krma (aflatoksin, trihoteceni, zearalenoni, fumonizini, ohratoksin A in Ergot alkaloidi).

*Odmerjanje: 0,5 – 1 % Mycofixa® v pripravljene krmi**
*0,25 – 0,5 % Mycofixa® 5.E v pripravljene krmi**

*Odvisno od stopnje onesnaženosti

Biomin® TopVital

Ravno v stresnih fazah, zlasti pri premeščanju, vremenskih spremembah v zimskih mesecih in pri prehodnih letnih časih je delujoč imunski sistem alfa in omega. Ciljno dodajanje vitaminov v stresnih fazah spodbuja živali k prireji in zvišuje njihovo odpornost.

Odmerjanje: 0,5 % v pripravljene krmi, po odmerkih ali 1-krat tedensko čez vse leto

Biomin® AW Top

Rastline, na primer: timijan, žajbelj, rožmarin in evkaliptus, so v humani medicini poznane po visoki vsebnosti eteričnih olj in njihovem pozitivnem učinku na dihalo. Biomin® AW Top kot aktivna substanca vsebuje kombinacijo eteričnih olj in se uporablja za izboljšanje hlevskega zraka ter kot spremljevalni ukrepi pri zdravljenju kašlja in po njem.

Odmerjanje: 0,2 % v pripravljene krmi

Digestarom® P.E.P. sol

Fitogene učinkovine zvišujejo prirejo, posebej pri prebavnih težavah. Digestarom® P. E. P. sol je vodotopen in ga lahko dovajamo s pitno vodo. Idealno za kratkoročno dovajanje v kritičnih fazah prebave.

*Odmerjanje: pujski + vzrejni prašiči:
30 ml/1.000 l vode;
pitani prašiči: 15 ml/1.000 l vode ali krmne juhe*

Biomin® Vit E 500

Genetske dispozicije in hitra rast lahko v stresnih situacijah povzročita nenadne izpade. Odmerki vitamina E in seleni učinkujejo spodbudno.

Odmerjanje: 0,5 % v pripravljene krmi

Linija izdelkov Biotronic®

Različni izdelki so bili razviti z namenom apliciranja krme oz. vode in služijo zniževanju pH-vrednosti, zmanjševanju kapacitete puferiranja in kontroli gramnegativnih bakterij, kot je *Salmonella spp.* ali *E. coli*.

- **Biotronic® SE forte**

Kombinacija sinergij delujočih organskih kislin učinkuje od korita prek želodca pa vse do črevesja – to je mogoče, zahvaljujoč mediju sekvenčnega sproščanja, edinstveni nosilni snovi, ki omogoča enakomerno sproščanje aktivnih sestavin.

- **Biotronic® Top3**

Poleg organskih kislin vsebuje tudi sekundarne rastlinske sestavine in Biomin® Permeabilizing Complex. Ta poskrbi za prepustnost zunanje membrane gramnegativnih bakterij in krepi protimikrobni učinek organskih kislin.

- **Biotronic® Multi liquid**

Za nakisanje pitne vode, biološko primerno.

- **Biotronic® Top liquid**

Poleg organskih kislin vsebuje tudi Biomin® Permeabilizing Complex ter služi nakisanju pitne vode in tekoče krme, konzerviranju krmil, površinski obdelavi silaže in čiščenju cevi v napravah za tekočo krmo.

Vlakna Biomin®

Biomin® ADF

Biomin® ADF je 100-odstotno sestavljen iz čiste lignoceluloze, torej neprebavljivih vlaken, in ne vsebuje bakterijskih fermentacijskih sestavin. Ta vir vlaknin odlikuje visoka vsebnost surovih vlaknin, ki imajo strukturni učinek in lahko vežejo velike količine vode. Izboljšata se prebava in konsistenca blata.

*Odmerjanje: vzreja – brejost: 2 – 4 %,
vzreja – sesanje: 1 – 2 %,
vzreja pujskov: 1 – 2 %,
pitani prašiči: 1 – 1,5 %.*

Biomin® BioFaser

Biomin® BioFaser lahko bakterijsko fermentira in se razgradi v črevesni flori debelega črevesja. Tako dosežemo visoko stopnjo fiziološke nasičenosti, ki pomirja živali. Prednost predstavlja tudi citronska kislina, ki jo vsebuje ta izdelek. Citronska kislina pozitivno vpliva na okus krme ter zvišuje razpoložljivost mineralnih snovi in prvin.

*Odmerjanje: vzreja – brejost: 3 – 8 %,
vzreja – sesanje: 1 – 3 %,
vzreja pujskov: 1 – 2 %, pitane svinje 1 – 3 %*

Biomin® OmegaFaser multi

Biomin® OmegaFaser multi je kombinacija izbranih virov vlaknin in združuje učinek različnih nosilcev surovih vlaknin. Biomin® OmegaFaser multi skrbi za visoko vsebnost bakterijskih fermentacijskih snovi, netopne sestavine vlaknin in za strukturo. Z visoko kapaciteto vezave vode in virov preprečuje lenost črevesja in pozitivno vpliva na prebavni trakt. Dodatno je na voljo energija v obliki maščobe. Ta prinaša dragocene maščobne kisline omega 3, ki so znane po pozitivnem vplivu na presnovo.

*Odmerjanje: vzreja – brejost: 3 – 10 %,
vzreja – sesanje: 1 – 5 %.*

Biomin® Ferkelfaser

Za stabilnost pri odstavitvi in vzreji. Ferkelfaser vsebuje kakovostne surove vlaknine, ki spodbujajo črevesno peristaltiko in tako poskrbijo za optimalno prebavo hranilnih snovi. Tako imajo bakterije Coli v zadnjem delu črevesa na voljo manj hranilnih snovi.

Odmerjanje: 1 – 3 % v krmi za pitane pujske

©Copyright BIOMIN Holding GmbH, 2017

All rights reserved. Any kind of reprint, reproduction, or any other kind of usage – whether partially or to the full extent – only allowed upon prior written approval by Biomin® Holding GmbH.

Verkaufs- und Servicenetzwerk:

BIOMIN Animal Nutrition GmbH

Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria

Tel: +43 2782 803 0

e-Mail: office@biomin.net

www.biomin.net

BIOMIN Animal Nutrition GmbH zertifiziert:



BIOMIN is part of ERBER Group