

# Učiti žreti – učiti prebavljati: zelo pomembno je dovolj zgodaj začeti dokrmeljati pujske

## CILJI

- **Zmanjšati stres prebavnega trakta**  
Pomeni bolj odporni pujski z konstantno ješčnostjo in stabilnimi prirasti
- **Ciljna podpora gnezd z velikim številom pujskov**  
Izkoristiti potencial manjših pujskov v gnezd

## REŠITVE

### 1. Učiti žreti

Zgodnje dokrmeljevanje zokusnim in visokokakovostnim predstarterjem (vzbujanje interesa)

### 2. Učiti prebavljati

Postopno vpeljevanje komponent na samo rastlinski osnovi (encimatski trening)

### 3. Stabilizacija črevesja

Ciljano vzpodbujanje razvoja črevesja in stabilizacija črevesne flore za dober prehod v kritični fazi odstavitve (podpora)



**Biomin®**

**BIOMIN Animal Nutrition GmbH**

Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria  
Tel: +43 2782 803 0, e-Mail: [service@biomin.net](mailto:service@biomin.net)  
[www.biomin.net](http://www.biomin.net)

**BIOMIN is part of ERBER Group**

BIOMIN Animal Nutrition GmbH zertifiziert:



# Koncept krmljenja

FO\_NURline\_FerkeL\_AT\_0617\_ASB

**Biomin®**



ODOJKOV

**NURline**

Copyright BIOMIN GmbH, 2017  
Alle Rechte vorbehalten. Mit Ausnahme der im Copyright, Designs and Patents Act von 1988 genannten Regelungen darf kein Teil dieser Veröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung des Inhabers des Urheberrechts in irgendeiner materiellen Form für kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder kopiert werden.  
Alle hierin enthaltenen Fotos sind Eigentum der BIOMIN Holding GmbH oder werden unter einer Lizenz verwendet.

## Koncept krmjenja ODOJKOV





Period	NURImilk	kot dopolnilo/nadomestek za mleko za pujske	BioLac	BMR (g/l)
Dan 2	NURImilk		BioLac	150 g/l
Dan 5	NURImilk	<b>NAUČITI SE JESTI</b> „tj. spodbuditi zanimanje“ cilj je redno uživanje trde krme	BABY EASY	100
Dan 15	NURImilk	<b>NAUČITI SE PREBAVLJATI</b> „tj. trening encimov“ cilje prilagoditev prebavnega trakta rastlinski hrani	PROFI MÜSLI	100
Dan 28	NURImilk	<b>STABILIZIRATI ČREVO</b> „tj. podpora“ cilj je spodbujati razvoj črevesja in stabilizirati črevesno floro	e-FIFTI F3 FM F20 FM s-30 s-50	50
Dan 42	NURImilk			30
				20
				30
				50

SESTAVINE IZDELKA					
Zita, razgradjaja					
Zita					
Viri beljakovin, prebavljivost +++					
Viri beljakovin, prebavljivost ++					
Mlečni izdelki					
Stadkor					

BIOMIN INSIDES					
Multitencim					
Fitazal					
Probiotiki					
SpurenIX <sup>+</sup>					
Mycotix <sup>®</sup> 5.E					
Biotronic <sup>®</sup> SE forte / Proaktiv					
Biotronic <sup>®</sup> Top3					
SCC					
Digestarom <sup>®</sup>					

## Koncept uporabe ODOJKOV



Za vaš specifičen primer povprašajte vašega BIOMIN svetovalca.

## Vzreja odojkov – naslednje točke bi morali upoštevati

### SPLOŠNO

- Dosledno vhlavljanje in izhlavljanje (vklj. s čiščenjem in z razkuževanjem) v hlevih, namenjenih praseti in vzreji

### OBDOBJE SESANJA

- Poskrbeti je treba za zadostno pridelavo mleziva (prilagojena oskrba svinje s hranilnimi snovmi, preprečevanje stresa pri prasetih).
- Vsak pujssek mora po kotitvi prejeti mlezivo.
- Pri velikih leglih je treba od 2. dne naprej dodajati mleko za pujske (pozor: higiena).
- Od 5. dne starosti je treba dodajati kakovosten prestarter, najpozneje od 2. tedna starosti (manj krme, bolj večkrat, in obvezno paziti na higieno).
- Strokovna izvedba zootehničnih ukrepov >> preprečiti je treba vnos in raznašanje klic.
- Od 1. tedna življenja morajo imeti pujski na voljo svežo, neoporečno vodo.
- Temperatura: pri svinjah ne sme biti previsoka (≤ 22 °C), pri pujskih pa mora biti dovolj topla (> 32 °C) >> gnezdo za pujske.

### FAZA ODSAVITVE

- Majhne, šibkeše pujske je treba odstaviti posebej in jih ciljno dlje časa krmiti s prestarterjem.
- Vzrejni hlev je čist, suh in ogrevan (28–30 °C; min. temperatura površine 25 °C).
- Razmerje med živaljo/krmilnim mestom 1 : 1.
- Krmiti najmanj (!) 2-krat dnevno.
- Načrtovanje neoviranih prehodov na drugo krmilo (mešati najmanj 3 dni).
- Razmerje med živaljo in napajanjem 1 : 10 (količina pretoka 0,5 – 1 l/minuto).
- V prvih dneh pogosteje obiskati hlev in zdravit pujske, da se jih spomni na hrano.
- Poskrbite za osvetlitev (v prvih 3 dneh neprekinjeno).
- Dosledno opazovati živali, da se lahko dovolj zgodaj odzove (težave z zdravljenjem, grizenje repa itn.).