

# Mycofix<sup>®</sup> Profarm

## TABELA ZA DOZIRANJE

### MIKOTOKSINSKA KONTAMINACIJA V [ppb]

**NIZKA    SREDNJA    VISOKA    METODA**

MIKOTOKSINSKA KONTAMINACIJA V [ppb]	NIZKA	SREDNJA	VISOKA	METODA	
<b>B-Trichothecene (DON, AcDON, NIV, Fus X)</b>					
Prašiči (svinje, marjasec)	<200	200-900	>900		
Prašiči (pujski)	<150	150-200	>200		
Prašiči (pitanci)	<250	250-1000	>1000		
Perutnina (nesnice, broilerji)	<300	300-1000	>1000	Encimska deaktivacija	
Perutnina (purani)	<200	200-800	>800		
Govedo (teleta)	<300	300-1000	>1000		
Govedo (krave molznice)	<1000	1000-2000	>2000		
Govedo (pitanci)	<1000	1000-2000	> 2000		
<b>A-Trichothecene (T-2 toxin, HT-2 toxin, DAS)</b>					
Prašiči (svinje, marjasec)	< 100	100-400	> 400		
Prašiči (pujski)	<50	50-100	>100		
Prašiči (pitanci)	<150	150-400	>400		
Perutnina (nesnice, broilerji)	<50	50-300	>300	Encimska deaktivacija	
Perutnina (purani)	<100	100-400	> 400		
Govedo (teleta)	<100	100-800	>800		
Govedo (krave molznice)	<100	100-800	> 800		
Govedo (pitanci)	<200	200-800	> 800		
<b>Zearalenon (ZON)</b>					
Prašiči (svinje, marjasec)	<50	50-250	>250		
Prašiči (pujski)	<100	100-250	>250		
Prašiči (pitanci)	<50	50-200	>200		
Perutnina (nesnice, broilerji)	<100	100-400	>400	Encimska deaktivacija	
Perutnina (purani)	<75	75-250	>250		
Govedo (teleta)	<100	100-250	>250		
Govedo (krave molznice)	< 100	100-200	>200		
Govedo (pitanci)	<200	200-300	>300		
<b>Ohratoksin A</b>					
Prašiči (svinje, marjasec)	<50	50-400	>400		
Prašiči (pujski)	<80	80-500	>500		
Prašiči (pitanci)	<25	25-200	>200		
Perutnina (nesnice, broilerji)	<10	10-150	>150	Absorbpcija	
Perutnina (purani)	<80	80-500	>500		
Govedo (teleta)	<100	100-300	>300		
Govedo (krave molznice)	< 200	200-500	>500		
<b>Aflatoksin B<sub>1</sub></b>					
Prašiči (svinje, pujski, marjasec)	<20	20-100	> 100		
Perutnina (nesnice, broilerji)	<20	20-200	>200		
Perutnina (purani)	50	50-300	>300	Absorbpcija	
Govedo (teleta, krave molznice)	<5	5-20	>20		
Govedo (pitanci)	<50	50-100	>100		
<b>Ergotni alkaloidi</b>					
Prašiči (svinje, pujski, marjasec)	<200	200-900	>900		
Prašiči (pitanci)	<800	800-5000	>5000		
Perutnina (nesnice, broilerji)	<1000	1000-4000	>4000	Absorbpcija	
Perutnina (purani)	<500	500-2000	>2000		
Govedo (teleta, krave molznice, pitanci)	<100	100-400	>400		
<b>Doziranje:</b>					
<b>GOVEDO</b>	<b>30 g/žival/ dan</b>	<b>60 g/žival/ dan</b>	<b>100 g/žival/ dan</b>		
<b>PRAŠIČI</b>	<b>0,5% v krmo</b>	<b>0,7% v krmo</b>	<b>1% v krmo</b>		
<b>PERUTNINA</b>	<b>0,5% v krmo</b>	<b>0,7% v krmo</b>	<b>1% v krmo</b>		